

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR**Coldrex Maxgrip Lemon, pulbere pentru suspensie orală**
Paracetamol/Acid ascorbic/Clorhidrat de fenilefrină**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să luați Coldrex Maxgrip Lemon, cu atenție, pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 3 zile.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Coldrex Maxgrip Lemon și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Coldrex Maxgrip Lemon
3. Cum să utilizați Coldrex Maxgrip Lemon
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Coldrex Maxgrip Lemon
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE COLDREX MAXGRIP LEMON ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Coldrex Maxgrip Lemon este un medicament împotriva răcelii și gripei care conține trei substanțe active:

- paracetamol care ameliorează durerea și reduce temperatura atunci când aveți febră;
- clorhidratul de fenilefrină este un decongestionant care desfundă nasul și sinusurile și vă ajută să respirați mai ușor;
- vitamina C (acidul ascorbic) înlocuiește vitamina C care se pierde în primele stadii de răceală și gripă.

Coldrex Maxgrip Lemon este un remediu folosit pentru ameliorarea simptomatică, pe termen scurt a gripei, stărilor febrile, frisoanelor și răcelilor comune, inclusiv a cefaleei, durerilor în gât, disconfortului și durerilor, congestiei nazale, sinuzitei precum și durerii și catarului nazal acut, asociate acesteia.

2. ÎNAINTE SĂ LUAȚI COLDREX MAXGRIP LEMON**Nu utilizați Coldrex Maxgrip Lemon dacă:**

- sunteți alergic (hipersensibil) la paracetamol, clorhidrat de fenilefrină, vitamina C sau la oricare dintre celelalte componente ale Coldrex Maxgrip Lemon (vezi pct. 6);
- dacă aveți insuficiență hepatică sau renală;
- dacă aveți hipertensiune arterială;
- dacă aveți hipertiroidism;

- dacă suferiți de o boală cardiacă;
 - dacă aveți diabet;
 - dacă sunteți în tratament cu alte medicamente (de exemplu antidepressive de tipul inhibitori de monoaminoxidază–IMAO, beta-blocante);
 - dacă aveți intoleranță la unele categorii de glucide (conține zahăr);
- Nu administrați copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Aveți grijă deosebită când luați Coldrex Maxgrip Lemon

Nu se recomandă asocierea cu alte medicamente folosite pentru răceală sau ca decongestive precum și cu alte produse care conține paracetamol.

Este necesară prudență la vârstnici și la pacienții hipertensivi deoarece fenilefrina poate crește tensiunea arterială.

Riscul hepatotoxicității paracetamolului este mai mare în caz de afectare hepatică pre-existentă sau când sunt asociate alte medicamente cu potențial hepatotoxic.

Dacă simptomele de răceală persistă adresați-vă medicului.

Cereți sfatul medicului sau farmacistului dacă nu sunteți sigur dacă puteți lua acest medicament.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu luați Coldrex Maxgrip Lemon

- împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol;
- cu alte medicamente decongestionante sau remedii pentru răceală;
- dacă sunteți în tratament cu antidepressive de tipul inhibitori de monoaminoxidază sau beta-blocante folosite în tratamentul problemelor cardiace și a hipertensiunii arteriale;
- dacă luați warfarină (folosit împotriva coagulării sângelui);
- dacă luați metoclopramida și domperidona (stimulează motilitatea stomacului și intestinului subțire și au efecte antivomitive);
- dacă luați colestiramina (rășină fixatoare de acizi biliari).

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, solicitați sfatul medicului sau farmacistului înainte de a lua orice medicament, inclusiv Coldrex Maxgrip Lemon.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Substanțele active conținute în Coldrex Maxgrip Lemon nu au proprietăți sedative. Medicamentul nu influențează capacitatea de a conduce mașina sau de a manevra utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Coldrex Maxgrip Lemon

Coldrex Maxgrip Lemon conține zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ LUAȚI COLDREX MAXGRIP LEMON

Doza normală pentru adulți (inclusiv vârstnici) și copiii cu vârsta peste 12 ani este de un plic la fiecare 4 sau 6 ore la nevoie. Nu luați mai mult de 4 plicuri în 24 de ore.

Medicamentul nu trebuie utilizat mai mult de 3 zile fără recomandarea medicului.

Nu administrați Coldrex Maxgrip Lemon copiilor cu vârsta mai mică de 12 ani.

Coldrex Maxgrip Lemon se înghite ca o băutură caldă.

Goliți conținutul unui plic într-o cană, adăugați apă fierbinte și mestecați bine.

Adăugați apă rece dacă este necesar.

Adăugați apă sau miere, după preferință.

Dacă luați mai mult decât trebuie din Coldrex Maxgrip Lemon

Solicitați imediat consult medical și explicați-i exact cât de mult ați luat. Medicul dumneavoastră vă va sfătui ce trebuie să faceți.

Este important să-i spuneți doctorului, chiar dacă vă simțiți bine. Dacă o persoană a luat prea mult paracetamol, există un risc serios de leziuni hepatice datorită întârzierii instituirii tratamentului.

Dacă uitați să luați Coldrex Maxgrip Lemon

Luați o doză atunci când vă amintiți. Nu luați mai mult de o doză la fiecare 4 ore. Nu luați două doze o dată pentru doza uitată.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Coldrex Maxgrip Lemon poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt rare și pot include:

- erupții cutanate și alte alergii;
- creșterea tensiunii arteriale;
- cefălee;
- senzație de amețală;
- insomnie;
- palpitații;
- vărsături;
- diaree.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ COLDREX MAXGRIP LEMON

A nu se lăsa la îndemana și vederea copiilor.

Nu utilizați Coldrex Maxgrip Lemon după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după **EXP.**). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.

Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Ce conține Coldrex Maxgrip Lemon

Substanțele active din Coldrex Maxgrip Lemon sunt paracetamol 1000 mg, acid ascorbic 40 mg și clorhidrat de fenilefrină 10 mg.

Celelalte componente sunt: zahăr, acid citric anhidru, citrat de sodiu, amidon de porumb, aromă de lămâie, ciclamat de sodiu, zaharină sodică, dioxid de siliciu coloidal anhidru și curcumină (E 100).

Cum arată Coldrex Maxgrip Lemon și conținutul ambalajului

Pulbere pentru suspensie orală.

Ambalaje

Cutie cu 5 plicuri a câte 6,427 g pulbere orală

Cutie cu 10 plicuri a câte 6,427 g pulbere orală

Deținătorul autorizației de punere pe piață

HIPOCRATE 2000 S.R.L.
Str. Prahova, nr. 6A, Sector 1, București, România

Producător

SmithKline Beecham S.A.,
Ctra de Ajalvir, Km 2,5, Alcala de Henares 28806, Madrid, Spania

Acest prospect a fost aprobat în

Mai, 2016